

## ملخص

أجريت الدراسة في مدينة قصر الصبيحي التي تقع شمال شرق الجزائر حيث امتدت سنتين من 2013 الى 2015. سمحت هذه الأخيرة برصد 42 نوعا من الطيور تنتمي الى 25 عائلة و 11 قسما. Les passeriformes هي السائدة حيث تشمل 15-عائلة ما يمثل نسبة (60%) من مجموع العائلات و يشمل على 29-نوعا من الطيور ما يمثل نسبة (69,04%) من مجموع الطيور المتواجدة في منطقة الدراسة.

تظهر الطيور تنوعا فيما يخص حالة الهجرة حيث تقسم الى 5 اقسام الفئة الأولى تتمثل في 19 نوعا من الطيور المعششة الغير مهاجرة، 10 أنواع معششة مهاجرة، 9 أنواع زائرة مؤقتة و 3 أنواع مهاجرة شتوية بالإضافة الى نوعين واحد معشش وقتي وواحد زائر عابث.

وفقا للأرضية التي تغطي منطقة الدراسة نميز ثلاثة أنواع مختلفة من، habitat Bâti gris: habitat Bâti، les habitatshabitat Bâti gris، espace vert، habitat forêt urbaine حيث يعتبر habitat Bâti gris الأكثر تجانسا حيث توجد منافسة كبيرة بين الطيور من حيث ضروريات الحياة.

تظهر النماذج البيولوجية المدروسة سلوكا إيجابيا معينا بكثافة عالية مقارنة بنظيراتها في شمال افريقيا وأوروبا ومع ذلك اختيار موقع التعشيش يخضع لاختبار قوى من طرف الطيور حيث نجد ان le Pigeon biset يعيش قبل l'Hirondelle وSerincini وrustique قبل Verdier d'Europe حيث تظهر هذه الأنواع بعض أوجه التشابه في سماتها التاريخية مع سكان شمال افريقيا.